

Инфекции, передаваемые половым путем - это болезни, которыми можно заразиться при половом акте без презерватива.

Заражение происходит при любом виде сексуального контакта (анальном, вагинальном, оральном). Кроме того, эти болезни передаются от матери ребенку, а некоторые из них и через кровь.

Заражение не всегда сразу проявляется, а может и вообще протекать незаметно. Тогда человек не знает о заболевании, ведет привычный образ жизни и может заражать других, даже не подозревая об этом.

Среди заболеваний, передающихся половым путем, чаще всего встречаются: ВИЧ, гепатит В, генитальный герпес, сифилис, гонорея ("триппер") и скрытые инфекции (трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, кандидоз).

Сифилис.

Вначале появляется твердый шанкр - безболезненная язвочка, после которой остается белесый рубчик. Потом язвочки заживают и человек некоторое время выглядит здоровым, а вирус тем временем разносится по всему организму, проникает во все органы, поражает кожу, кости, нервную систему и слизистые оболочки. На коже и слизистых может появляться сыпь, начинают выпадать волосы. Необходимо помнить, что заболевание может протекать в скрытой форме, без внешних проявлений. Сифилисом можно заразиться:

- ▶ половым путем;
- ▶ через кровь (инъекции, татуировки);
- ▶ при пользовании чужими зубными щетками, посудой, помадой, сигаретой и т.д., если у больного были язвы на губах или во рту.

Гонорея ("триппер")

Проявляется через 3-7 дней после заражения. У мужчин появляются гнойные выделения, жжение при мочеиспускании, боли внизу живота. У женщин вообще может не быть проявлений заболевания. Все признаки почти исчезают к концу второй недели, но это не означает выздоровления. Инфекция продолжает жить в организме, разрушая слизистые оболочки мочеполювых органов и прямой кишки.

Трихомониаз

Через 10 дней - 6 месяцев после заражения могут появляться зуд, жжение, пенные выделения с неприятным запахом. Но может не быть никаких признаков. Человек не знает о своей болезни и не лечит ее. Тогда возникают осложнения: воспаление мочеполювых органов, брюшины, проблемы с потенцией и бесплодие. Трихомониазом можно заразиться:

- ▶ при сексуальных контактах без презерватива;
- ▶ через зараженное нижнее белье и полотенце.

Хламидиоз

Чаще всего протекает без выраженных проявлений. Иногда, через 5-30 дней, могут возникать неприятные ощущения, реже зуд и боль половых органов. Если хламидиоз не лечить, наблюдается снижение потенции, бесплодие, воспаление половых органов, заболевания печени, почек, суставов и слизистых оболочек глаз.

Уреаплазмоз (микоплазмоз)

Чаще всего никаких проявлений инфекции нет - и человек считает себя здоровым. Иногда

появляется зуд и незначительные выделения из половых органов. Если эти заболевания не лечить, они могут привести к воспалению мочеполювых органов и бесплодию.

Это заболевание вызывается дрожжеподобными грибами. Когда иммунитет ослаблен, микроб начинает бурно развиваться. Но им можно заразиться и половым путем. Если кандидоз не лечить, он приводит к воспалению мочеполювых органов.

Папилломовирусная инфекция

На половых органах появляются бородавчатые разрастания. Со временем они могут приобретать вид цветной капусты или петушиных гребней. Начинаются боли при мочеиспускании и половом акте, зуд, жжение, кровоточивость. Без лечения папилломы быстро увеличиваются и размножаются, поэтому лечение нужно начать как можно раньше.

Генитальный герпес

Обычно через 3-7 дней после заражения появляется чувство жжения, зуд, покраснение, а затем мелкие пузырьки, на месте которых появляются язвочки. В это время наблюдается ухудшение самочувствия, увеличение лимфоузлов. Может ощущаться боль при мочеиспускании. Вылечить эту болезнь очень трудно. Поэтому чем раньше начато лечение, тем больше шансов на успех.

**ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ЗАРАЖЕНИЯ НУЖНО
ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРЕЗЕРВАТИВАМИ.**